

# 高山赤十字病院 化学療法レジメン一覧

## ●肝・胆・膵がんレジメン一覧

### 肝がん

サイラムザ単剤	day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
サイラムザ(RAM)	8mg/kg	○													

テセントリク+アパステン	day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
テセントリク(Atezo)	1200mg	○																				
アパステン(BEV)	15mg/kg	○																				

### 胆道がん

GEM+CDDP(胆道)	day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
ゲムシタビン(GEM)	1000mg/m <sup>2</sup>	○							○													
シスプラチン(CDDP)	25mg/m <sup>2</sup>	○							○													

S-1+GEM(3週型)	day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
エスワンタイホウ(S-1)	80mg/m <sup>2</sup> /日	夕	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
ゲムシタビン(GEM)	1000mg/m <sup>2</sup>	○							○													

S-1は1日目夕食後より開始し、15日目朝まで内服する。◎は1日2回服用

GCS(GEM+CDDP+S-1)	day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
エスワンタイホウ(S-1)	80mg/m <sup>2</sup> /日	夕	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
シスプラチン(CDDP)	25mg/m <sup>2</sup>	○													
ゲムシタビン(GEM)	1000mg/m <sup>2</sup>	○													

S-1は1日目夕食後より開始し、8日目朝まで内服する。◎は1日2回服用

### 膵がん

FOLFIRINOX	day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
オキサリプラチン(L-OHP)	85mg/m <sup>2</sup>	○													
レボホリナート(I-LV)	200mg/m <sup>2</sup>	○													
トポテシン(CPT-11)	180mg/m <sup>2</sup>	○													
フルオロウラシル(5-FU)	400mg/m <sup>2</sup>	○													
フルオロウラシル(5-FU)	2400mg/m <sup>2</sup>	○	…												

mFOLFIRINOX	day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
オキサリプラチン(L-OHP)	85mg/m <sup>2</sup>	○													
レボホリナート(I-LV)	200mg/m <sup>2</sup>	○													
トポテシン(CPT-11)	150mg/m <sup>2</sup>	○													
フルオロウラシル(5-FU)	2400mg/m <sup>2</sup>	○	…												

アフラキサン+ゲムシタビン	day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
アフラキサン(nab-PTX)	125mg/m <sup>2</sup>	○								○						○													
ゲムシタビン(GEM)	1000mg/m <sup>2</sup>	○								○						○													

GEM単剤	day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
ゲムシタビン(GEM)	1000mg/m <sup>2</sup>	○								○						○													

オニパイド+5-FU/LV	day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
オニパイド(nal-IRI)	70mg/m <sup>2</sup>	○													
レボホリナート(I-LV)	200mg/m <sup>2</sup>	○													
フルオロウラシル(5-FU)	2400mg/m <sup>2</sup>	○	…												

S-1+GEM(3週型)	day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
エスワンタイホウ(S-1)	80mg/m <sup>2</sup> /日	夕	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
ゲムシタビン(GEM)	1000mg/m <sup>2</sup>	○							○													

S-1は1日目夕食後より開始し、15日目朝まで内服する。◎は1日2回服用